

Status: detta dokument är beslutad av chefläkarna i policygruppen för TakeCare	Giltig fr.o.m. 2014-10-01	Giltig längst t.o.m. 2016-10-01
Handläggare: Sten Jacobson	Version: 2.0	Sid 1

# REGLER FÖR LÄKEMEDELSJOURNAL I TAKECARE

## DOKUMENTATION AV LÄKEMEDEL UNDER FÖRLOSSNINGEN OCH EFTERVÅRDSTIDEN

Samtliga förlossningsavdelningar i Stockholm- och Gotlands län använder sig av två journalsystem - Obstetrix och TakeCare. Dokumentation av graviditetsövervakning sker oftast i Obstetrix på barnmorskemottagningarna.

Under förlossningen är partogrammet verktyget för att ge en överskådlig bild av förlossningens progress. På partogrammet anges även interventioner som använts och som kan påverka förlossningsförloppet, exempelvis om patienten fått bedövning eller ett värkförstärkande dropp.

Dokumentation av läkemedel som är specifika för förlossningssituationen och som inte påverkar handläggandet i eftervården dokumenteras i partogrammet.

För övriga läkemedel är läkemedelsjournalen i TakeCare den sammanhållna läkemedelsjournalen under förlossningen.

### **Dokumentation i Obstetrix (originalhandling)**

Nedanstående läkemedel, som är specifika för förlossningssituationen och som inte påverkar handläggandet i eftervården, ska dokumenteras i partogrammet (med automatisk överföring till journaltext).

- Oxytocindropp i *värkförstärkande syfte*
- Oxytocin 8,3 ug/ml =1 ml efter barnets framfödande
- Ringer-Acetate inför Epiduralblockad
- EDA/spinal inklusive bolusdoser
- PCB
- PDB
- Infiltration inför suturering

Konakion som ges till barnet i samband med förlossningen, förs in i partogrammet. Övriga läkemedel till barnet ordinerar i barnets egen journal.

## Dokumentation i TakeCare (originalhandling)

Alla övriga läkemedel skall ordineras och administreras i läkemedelsmodulen i TakeCare. Detta gäller således t ex

- Oxytocin som ges pga. blödning
- Metylergometrin
- Smärtstillande mot eftervärkar
- Antibiotika
- Cortison
- Atosiban m. fl. som kan komma ifråga vid prematura kontraktioner

De läkemedel som skrivs in i TakeCare bör endast kortfattat dokumenteras i Obstetrix t.ex. som notat i partogrammet: "Fått Bensyl Pc".

## Information

Många Barnmorskemottagningar saknar tillgång till TakeCare. I *epikrisen* i Obstetrix ska dokumenteras om patienten fått läkemedel som kan ha betydelse för nästa aktör i vårdkedjan, till exempel om patienten fått antibiotika.