

 Stockholms läns landsting		1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT FO Graviditet - och förlossning Handläggare: Ulla Nylander	Rutinbeskrivning ver. 1.0	Giltig fr.o.m. 2013-02-08

Regler för dokumentation av läkemedel under förlossningen

Reglerna i detta dokument gäller för samtliga användare av Journalsystemet Obstetrix i Stockholms Läns Landsting och Region Gotland. För tillämpning av reglerna ska lokala rutiner finnas. Regler för dokumentation av läkemedel i journalsystemet Take Care finns angivna i separat dokument.

Samtliga förlossningsavdelningar i Stockholm- och Gotlands län använder sig av två journalsystem - Obstetrix och Take Care.

Under förlossningen är partogrammet ett oundgängligt verktyg för att ge en överskådlig bild av förlossningens progress. På partogrammet anges även interventioner som använts och som kan påverka förlossningsförloppet, exempelvis om patienten fått bedövning eller ett värkförstärkande dropp.

I syfte att undvika onödig dubbeldokumentation av läkemedel som är specifika för förlossningssituationen och som inte påverkar handläggandet i eftervården ska nedanstående läkemedel dokumenteras i partogrammet (med automatisk överföring till journaltext).

- Oxytocindropp i värkförstärkande syfte
- Oxytocin 8,3 ug/ml =1 ml efter barnets framfödande
- Ringer-Acetat inför Epidural/Spinalbedövning
- Epidural/Spinalbedövning inklusive bolusdoser
- Paracervikalblockad
- Pudendusblockad
- Infiltration inför suturering
- Läkemedel i samband med induktion

Alla övriga läkemedel skall ordinerars och administreras i läkemedelsmodulen i TakeCare. Detta gäller således t ex

- Oxytocin som ges postpartum pga. blödning,
- Methergin och smärtstillande läkemedel mot eftervärkar,
- Antibiotika
- Betapred,
- Tractocil och Bricanyl som kan komma ifråga vid prematura kontraktioner.

Dubbeldokumentation ska undvikas, d v s de läkemedel som skrivs in i TakeCare bör endast kortfattat dokumenteras i Obstetrix t.ex. som notat i partogrammet: "Fått Bensyl PC" Se TakeCare.

Vaccinationer i samband med graviditet/förlossning dokumenteras i TakeCare och i Obstetrix.

Läkemedel som ges till barnet i samband med förlossningen dokumenteras i barnets Obstetrixjournal, FV2 (ex K-vitamin och Paracetamol).

Många Barnmorskemottagningar saknar tillgång till Take Care. Därför är det viktigt att i *epikrisen* ange om patienten fått läkemedel som kan ha betydelse för nästa aktör i vårdkedjan, till exempel om patienten fått antibiotika.